

OLMANING MONILIOZ KASALLIGIGA QARSHI ZAMONAVIY KURASH CHORALARINI OLIB BORISH HAMDA ISHLAB CHIQISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371683>

Arzibayeva Sevara Bahromjon qizi

Abduqayumov Islomjon Ilhomjon o'g'li

Abdurahimov Diyorbek Dilshodjon o'g'li

Andijon qishloq xojaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya

Ushbu maqolamizda Olmaning monolioz kasalligiga qarshi zamonaviy kurash choralarini olib borish bilan birga monolioz kasalligiga qarshi kemyoviy preparatlarni qo'llab yuqori biologik samara olishdan iborat.

Kalit so'z

tuproq, olma kochatlari, o'sishi rivojlannishi, meva chirish, fungisitlar, xosildorlik.

Tadqiqotobekti: Qishloq xojaligida innovatsion ishlanmalar va maslahat markazi intensiv bog sharoitida Olmaning monolioz kasalligiga qarshi zamonaviy kurash choralarini olib borish monolioz kasalligiga qarshi - kemyoviy kurash (Aramis, Sillit) choralar qo'llash hisobiga o'rtacha 73,7% biologik samara olindi.

Tadqiqot natijalari: Olmaning monolioz kasaligizarari o'rganilib, unga qarshi kurash choralarini takomillashtirildi.

Ilmiy yangiligi: Andijon viloyati sharoitida olma kochatlarining monolioz kasalligiga qarshi turli kemyoviy moddalarining ta'sirini aniqlashdan iborat bo'llgan va baholangan.

Amali yahamiyati: Andijon viloyati sharoitida monolioz zamburugiga qarshi turli kemyoviy moddalarining ta'sirini aniqlash

Qo'llash soxasi: Respublikamizdag'i barcha bog'dorchilik fermer xojaliklarida qo'llash mumkin.

Annotation. This article describes the specifics of potato cultivation, including the fact that 20% of the annual norm of nitrogen fertilizer with planting, the remaining amount of phosphorus fertilizers, one of the main elements determining the yield of potatoes is the number of stems in the bush and seed is described.

Key words : soil, apple seedlings, growth development, fruit rot, fungicides, productivity.

Research object : Center for innovative developments and consulting in agriculture in intensive garden conditionsCarrying out modern control measures against apple monoliosis disease

73.7 % biological effect was obtained due to the use of measures against monoliosis - chemical control (Aramis, Sillit).

Research results : The harm of apple moniliosis disease was studied and measures to combat it were improved.

Scientific novelty : the effect of different chemicals against moniliosis disease of apple seedlings was determined and evaluated in the conditions of Andijan region.

Practical significance : determination of the effect of various chemicals against moniliosis fungus in the conditions of Andijon region

Field of application : It can be used in all horticultural farms in our republic.

Kirish Bogdorchilik - Respublikamiz qishloq xojaligidagi eng koop mexnat talab etiladigan tarmoq hisoblanadi. Mustaqqilimizni dastlabki yillaridan boshlab, bogdorchilik tarmogini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, hozirgi kunda Respublikamizning koop xududlarida uzum, meva va sabzavotlar yetishtirish bo'yicha salmoqli yutuqlarga erishib kelinmoqda.

Muxtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan Respublikamiz xududlarida intensiv boglarni tashkil etish, maydonlarni kengaytirish va ularni rivojlantirish bo'yicha berayotgan takliflari asosida, hozirgi kunda keng koqlamda ishlar olib borilmoqda.

Ozbekiston Respublikasi hukumati tomonidan meva-sabzavotchilikni talab darajasida rivojlantirish uchun koop qarorlar tashkiliy masalalar hal qilindi. Meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan shirkat xojaliklar tugatilib, fermer xojaliklari tashkil etildi. 2019 yilda sabzavot ekinlarining umumiyligi maydoni 194,6 ming gektarga yetdi va 5909 ming tonna sabzavot maxsuloti ishlab chiqarildi. Hosildorlik 311 ts/ga yetkazildi.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi

Kartoshka yumshoq tuproq ekini, chunki uning tugenagi yer ostida shakllanadi. Shuning uchun u tuproqning havo rejimiga yuqori talabchan. Kartoshka tuproqdagi oziq elementlarga talabchan o'simlik. Bu uning biologik xususiyatlari, koop miqdorda biomassa toplashi va nisbatan ildiz sistemasining kuchsiz rivojlanganligi bilan bogliq. O'rtacha xar 100 sentner (10 tonna) kartoshka hosili ozi bilan 50 kg azot, 20 kg fosfor, 90 kg kaliyni olib chiqib ketadi. Oziq elementlarni yerdan olish bo'yicha kartoshka lavlagi va ba'zi texnik hamda sabzavot ekinlarni hisobga olmaganda koopchilik ekinlardan ustun turadi. Hozirgi

vaqtida O'zbekiston respublikasi davlat reystriga kartoshkaning 100 dan ortiq navlari kiritilgan. Jumladan quvonch, red scarlet, gala, santé, romano, kondor, pikasso, marfona, sarnav, piskom, serhosil, umid, saviola, silvana, arizona, arnova, kabi navlari keng maydonlarda ekilmoqda.

Tadqiqot natijalari

Kartoshka hosildorligini oshirish va ishlab chiqarishni ko'paytirishning asosiy vositalaridan biri ekin navini to'g'ri tanlash va sifatli urug'lik materialini ekish hisoblanadi. Nav va urug'lik tugunaklarini to'g'ri tanlab ekish orqali hosildorlikni 2-2,5 hissa oshirish mumkun. Kartoshka navlari pishib yetilish muddatiga qarab tezpishar, o'rta tezpishar, o'rtapishar, o'rta kechpishar va kech pishar navlarga bo'linadi. O'suv davri navaqa qarab 75 kundan 105 kungacha, hosildorligi esa gektariga 35-40 tonnani tashkil etadi. Iste'mol uchun yetishtirilgan kartoshka tugunak ko'zchalari yuza, nisbatan tekis, ya'ni archilganda etining ko'p qismi chiqimga chiqmaydigan navlar maqsadga muvofiqdir. Kartoshkaning fitoftora, so'llish, turli chirishlar, rak, viruslarga, nematodalarga, zararkunandalarga bardoshliligining ahamyati katta, ayniqsa aynimaydigan yuqori haroratga chidamli, virusli, zamburug', mikoplazma hamda bakteriyali kasalliklarni yuqtirmaydigan navlarning bo'llishi muhimdir. Tadqiqot ishining ob'ehti va predmeti: Olmaning "Golden" navida Olmaning Moniliozining rivojlanishi va tarqalishini aniqlashni o'rganish.

Tadqiqot ishining maqsadi va vazifalari: Andijon tumani sharoitida Olmaning monilioz kasaligi bilan zararlanishi, uning zarari, kasalikning biologiyasi va tarqalishini aniqlashni o'rganish orqali turli kimyoviy moddalarning samaradorligini aniqlashdan iborat

Dehqonchilikda har qanday ekinlardan yuqori hosil olishda qo'llanilgan moddaning shu ekinga nechog'lik kasalikka ta'siri kamayishi bilan birga hosildorlikning ortishiga ta'sir eta olishi muhimdir.

Biz olib boradigan tajriba Andijon viloyati sharoitida olma navlarini olmaning monilioz (*Monilia fructigena*) bilan zararlanishi zarari, tarqalishi, ularning biologiyasi va "Golden" navning olmaning moniliozga bo'lgan chidamlilagini o'rganish orqali olmaning "Golden" navaqa olmaning monilioz kasaligi ta'siri va uning samaradorligini hamda moniliozning rivojlanishini o'rganish hamda unga samarali kurash olib borishdan iborat.

Ilmiy yangiligi: Andijon vilyati sharoitida olmaning monilioz kasaligiga qarshi turli kimyoviy moddalarning ta'sirini zararkunandaning biologiyasi va tarqalishini bashorat qilish va tarqalishini aniqlashni o'rganish orqali turli kimyoviy moddalarning samaradorligini aniqlashdan iborat. Andijon

viloyatining oʻtloqi boʻz tuproqlari sharoitida olmaning „Golden“ navini olmaning monilioziga hamda hosildorligi va sifat koʻrsatkichlariga kimyoviy moddalarning taʼsiri oʻrganiladi. Mevali bogʻ zararli organizmlariga qarshi kurashda kasallik holatini nazorat qilish natijalari batafsil tahlil qilinib, ularga qarshi kurash olib borishda intellektual kurash tizimini yaratish.

Mevali bogʻ kasalliklariga qarshi kurashda Olmaning monilioz kasaligini rivojlanish muddatlarini aniqlash usullaridan foydalanish tavsiya etilgan.

Tadqiqot natijalarining nazariy va amaliy ahamiyati Andijon viloyati Andijon tumani sharoitida olmani monilioz kasalligiga qarshi turli kimyoviy moddalarning taʼsirini oʻrganish. Shuni xisobga olgan xolda, bu zararkunandaning koʻpayishiga va olma bogʻlariga tarqalishini va zararini tahlil qilgan holda, ularga qarshi foydali kimyoviy moddalarni qoʻllab, ularni taʼsiri natijasida ularning samaradorligini aniqlash maqsadida dala tajribalarini oʻtkazishni rejalashtirdik. Natijalarning eʼlon qilinganligi. Ilmiy tadqiqot natijalari boʻyicha jurnallarda 2 ta maqola chop etildi.

Ish tuzilmasining tavsifi; Olmadan moʼl hosil yetishtirishni olib borilayotgan umumiy tadbirlarga bogʼliq boʼladi. Shuning uchun bugungi kunga kelib olmani oʼsish va rivojlanishiga sof ekologik omillarning taʼsiri kattadir. Buni hisobga olgan holda yetishtirib kelinayotgan navlarni yashash davrini uzaytirishda hamda moniliozga qarshi yangi istiqbolli kimyoviy moddalardan foydalanish maqsadga muvofiq deb bilamiz.

Dissertatsiya kirish, adabiyotlar sharhi, tajriba oʻtkazish sharoitlari va uslublari, tadqiqot natijalari, xulosalar, ishlab chiqarishga tavsiyalar, adabiyotlar roʼyxatidan iborat.

Xulosa

Olmada Monilia fruktigena bogʼdorchilikda eng xavfdi zamburugʼ boʼlib urugʼi mevalarni rivojlanishida toʼsqinlik qilib kelayotgan patogen boʼlib hisoblanadi Uing patogenli qobililiyatini pasaytirish uchun tuproqdan infeksiya zaxiasidan tozalash muxim axamiyatga ega. Buning uchun zamburugʼga qarsh kurushda agrotexnik kurash chorasi bilan uni tuproqdan tozalashning imkonи yoʼq. Shuning uchun ilgʼorlar tajribasidan va eng soʼngi fan yutuqlaridan foydalanish talab etiladi ,shundagina patogenni tuproqdan maʼlum darajada kamaytirshga erishiladi. Natijada bogʼdorchilikni rivojlanishiga yoʼl ochiladi

Moniliozkasalligi olmada dunyoning barcha mamlakatlarida, jumladan Markaziy Osiyo davlatlarida va Oʻzbekistonning barcha viloyatlarida tarqalgan.

Kasallik olma daraxtlarining barg, gulkosabarglari va mevalarini, barg va meva bandlarini, kamroq hollarda novda va kurtak tangachalarini (qobigini) zararlaydi. Agar olmani bu kasallikdan muddatida himoya qilinmasa xosildorlik 40-45 % gacha kamayadi.

Olmada monilioz kasalligini Monilia fruktigenaaskomitset (pirenomitset) zamburugni qozgatadi yerga tokilgan barg va mevalarda zamburugning psevdotetsiyleri stroma ichida rivojlanadi.

Zamburug konidiyalar havo nisbiy namligi eng kami bilan 60-70% bolganida, olsimlik birlamchi zararlangandan 8-21 kun (17-21oS haroratda 8-9 kun) oltganda paydo boladi.

Kasallik bilan madaniy olmadan tashqari yovvoyi togolma, dolana, chetan, pirakanta va yapon mushmulasi zararlanadi.

Olmani monilioz kasalligidan kimyoviy himoya qilish maqsadida andoza variantida - Vektra 10% sus.k. fungitsidi 0,3 l/ga, qollanilganda 71,2 %, tajriba variantida - Aramis s/k 0.8kg/ga qollanilganda 76,0 % , Sillit s/k 1.0l/ga. qollanilganda 74,6 % biologik samaradorlikka erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ozbekiston respublikasi prezidentining respublikada kartoshka yrtishtirishni kengaytirish va urugchiliginin yanada rivojlantirish tolgorisidagi 2020-yil 6-maydagi PQ-4704- son qarori.
2. Bogdorchilik-uzumchilik shirkatlari tolgorisidagi nizomni tasdiqlash haqida Ozbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining qarori Toshkentsh., 2011 yil 1 mart, 51-sonwww.lex.uz
3. Ostonaqulov. Ozbekistonda tuginak mevali ekinlar. Monografiya; Navroz- Toshkent: 2020- 324 bet